



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
Nr. RO/2019/0233/MRA/IE/BPA 70515

În conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 4.03.2019 și 29.07.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : SLOVENIA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. : IE/BPA 70515

II. Data emiterii autorizatiei: 03.04.2019, rescris in data de 23.05.2019 si 10.09.2020.

III. Data expirării autorizatiei : 09.04.2023

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: [REDACTED]

Alte denumiri comerciale: [REDACTED]; Glodacid plus blocuri de parafina; [REDACTED]

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI : Unichem d.o.o
Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: Unichem d.o.o
Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : Unichem d.o.o
Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia
Loc de productie : Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, Slovenia

NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: ACTIVA s.r.l.
Via Feltre 32, 20132, Milano , Italia
Loc de productie : Tezza S.r.l. via Tre Ponti 22 37050 S. Maria Di Zavio , Italia

VI.

TIPUL DE PRODUS : TP 14-Rodenticide



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI : Publicul general/larg (non-profesionisti), profesionisti (specialisti), profesionisti calificați/instruiti (experti)

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Momeala rodenticida sub forma de bloc cerat cu 0,0029% brodifacoum ca substanta activa, pentru combaterea soarecilor de casa (*Mus musculus*) si a sobolanilor (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis) – juvenili si adulti, cu utilizare de catre neprofesionisti (publicul larg), profesionisti si profesionisti instruiti.

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1) Substanta activă

Denumirea comună	<i>Brodifacum</i>
Denumirea IUPAC	[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substantă activă	0,0029%

2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice

Simboluri	GHS08
Fraze de pericol (H)	H373- Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.
Fraze de prudenta (P)	P260- Nu inspirați praful. P314- Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501- Aruncați conținutul/recipientul la în conformitate cu reglementările locale/ regionale/naționale.
Pictograma(e)	

XI. AMBALAREA

Publicul larg (interior) pentru soareci de casa, animale tinere si adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului si materialul de ambalare:

Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă):

-în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g

-în pachete din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g

-în containere din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g

-în găleți din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g

-în cutii de carton sau cutii fibrolemnoase (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



-În cutii de carton sau cutii fibrolemnoase cu sac sau căptușeală din PE (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100 g

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan, care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100 g

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100 g

-Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 100g

Publicul larg (interior) pentru șobolanul brun și negru, animale tinere și adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Blocuri vrac de 5 g - 60 g (cu sau fără cârlig/sârmă):

-În plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g

-În pachete din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-În containere din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-În găleți din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-În cutii de carton sau cutii fibrolemnoase (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g

-În cutii de carton sau cutii fibrolemnoase cu sac sau căptușeală din PE (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan, care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

-Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g

Publicul larg (exterior, în jurul clădirilor) pentru șobolanul brun și negru, animale tinere și adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Blocuri vrac de 5 g - 60 g (cu sau fără cârlig/sârmă):



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g
 - în pachete din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
 - în containere din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
 - în găleți din PE sau PP (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
 - în cutii de carton sau cutii fibrolemnoase (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g
 - în cutii de carton sau cutii fibrolemnoase cu sac sau căptușeală din PE (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g
 - Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan, care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g
 - Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300g
 - Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan). Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă (cu un dispozitiv de avertizare tactilă) până la 300 g
- Profesionisti/specialisti (interior) pentru șoareci de casa, animale tinere si adulte
- Formule de momeală:
- Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.
- Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:
- Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.
- Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.
- Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-20 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg
 - Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece)
 - Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg
 - Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-20 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece)



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

Profesionisti/specialisti (interior) pentru sobolanul brun si negru, animale tinere si adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

-Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

Profesionisti/specialisti (exterior, in jurul cladirilor) pentru soarece de casa, sobolanul brun si negru, animale tinere si adulte

Formule de momeală:

-Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:

Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg
 - Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)
 - Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg
 - Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)
 - Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg
- Profesionisti instruiti/experti (interior) pentru soarece de casa, sobolanul brun si negru, animale tinere si adulte

Formule de momeală:

- Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.
- Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:
- Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.
- Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.
- Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20kg
 - Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg
 - Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg
 - Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)
 - Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg
 - Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)
 - Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg
- Profesionisti instruiti/experti (exterior, în jurul clădirilor) pentru soarece de casa, sobolanul brun si negru, animale tinere si adulte
- Formule de momeală:**
- Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
- Aplicare directă în vizuină a momelii gata de utilizare
- Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:
- Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: +(40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22



Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg

-Blocuri vrac de 5 g-60 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

-Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 5 g-60 g (până la 20 g momeală totală per stație de intoxicare șoarece sau 60 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

Profesioniști instruiți/experti (în canalizare) pentru șobolanul brun, animale tinere și adulte

Dimensiunea minimă a cutiei este de 3 kg.

Dimensiunea maximă a cutiei exterioare este de până la 25 kg.

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în plicuri din polietilenă (PE) sau din polipropilenă (PP) sau PE/PP sau hârtie/PE ambalate în cutii de carton sau ambalaj exterior fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în containere din PE sau PP până la 25 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în găleți din HDPE sau PP până la 20 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos până la 20 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în cutii de carton sau ambalaj fibrolemnos cu sac sau căptușeală din PE până la 20 kg

-Blocuri vrac de 10 g-200 g (cu sau fără cârlig/sârmă) în pungi natron până la 25 kg

-Stații de intoxicare preumplute sau reîncărcabile rezistente la șocuri din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece care conțin unul sau mai multe blocuri de 10 g-200 g (până la 200 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg

-Stație de intoxicare (reîncărcabilă sau de unică folosință) din HDPE sau PP pentru șobolan sau șoarece, care conține unul sau mai multe blocuri de 10 g-200 g (până la 200 g momeală totală per stație de intoxicare șobolan)

-Stații de intoxicare ambalate în înveliș exterior din carton sau din material plastic sigilat la cald sau folie termorezistentă până la 20 kg



XII. INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :

Manipulare:

Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice (EN 374, categoria III).

Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă. Evitați contactul cu pielea atunci când aruncați resturile de momeală.

Utilizatori non-profesionisti (publicul larg): - in interior

Soareci

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Capcanele trebuie verificate cel puțin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei si cel puțin o data pe saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Nu miscati sau mutati capcanele cateva zile dupa ce ati amplasat momeala. Daca nu exista dovezi de activitate a sobolanilor dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai intensa.

Capcanele trebuie verificate doar la 5 - 7 zile de la inceputul perioadei si cel puțin saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Utilizatori non-profesionisti (publicul larg): - exterior in jurul cladirilor

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Amplasati capcanele in zone neinundabile.

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Nu miscati sau mutati capcanele cateva zile dupa ce ati amplasat momeala. Daca nu exista dovezi de activitate a sobolanilor dupa 7-10 zile, mutati momeala într-o zona cu activitate mai intensa. Inlocuiti momeala din capcane atunci cand aceasta a fost afectata de apa ori murdarie.

Capcanele trebuie verificate doar la 5 - 7 zile de la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Utilizatori profesioniști: - in interior

Soareci

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii.

Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

La selectarea rodenticidului de utilizat trebuie sa se tina seama de rezistenta populatiei vizate. In zonele susceptibile de dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora.

[Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului ai se aplica, langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicatie.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Sobolani

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Nu miscati sau mutati capcanele cateva zile dupa ce ati amplasat momeala. Daca nu exista dovezi de activitate a sobolanilor dupa 7-10 zile, mutati momeala într-o zona cu activitate mai intensa. Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 5 - 7 zile la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii.

Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

La selectarea rodenticidului de utilizat trebuie sa se tina seama de rezistenta populatiei vizate. In zonele susceptibile de dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora.

[Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului ai se aplica, langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicatie.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Utilizatori profesioniști: - exterior in jurul cladirilor

Soareci de casa si/sau sobolani

Pentru soareci:

Infestare mare: maxim 20 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 2 m.

Infestare mica: maxim 20 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Pentru sobolani:

Infestare mare: maxim 60 g momeala / statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 5 m.

Infestare mica: maxim 60 g momeala / in statie de intoxicare (capcana nedemontabila), la fiecare 10 m.

Protejati momeala impotriva intemperiiilor (ploaie, ninsoare, etc.). Amplasati capcanele in zone neinundabile.

Inlocuiti toata momeala afectata de apa sau murdarie din capcane.

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Capcanele trebuie verificate cel putin o data la 2 - 3 zile la inceputul perioadei, pentru soareci, doar la 5-7 zile de la inceputul ei, pentru sobolani, si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru a inlatura cadavrele rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

La selectarea rodenticidului de utilizat trebuie sa se tina seama de rezistenta populatiei vizate. In zonele susceptibile de dovezi de rezistenta la ingrediente active specifice, evitati utilizarea acestora. [Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului ai se aplica, langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicatie.

Utilizarea acestui produs ar trebui sa elimine rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs (de ex. eticheta si/sau prospectul) recomanda explicit, in cazul suspiciunii de ineficienta la finalul perioadei de utilizare (inca se mai observa activitate a rozatoarelor), ca utilizatorul sa solicite asistenta din partea furnizorului produsului sau sa apeleze la serviciile specialistilor.

Nu utilizati produsul ca momeala permanenta sau in doza de soc.

Utilizatori profesioniști instruiti: - in interior

Soareci de casa si/sau sobolani

Maxim 20 g (soareci) sau 60 g (sobolani) de momeala in capcane nedemontabile sau capcane acoperite amplasate din 10 in 10 m (5 m in zonele cu infestare mare).

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii.

Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

Nu utilizati prin rotatie anticoagulante diferite de putere similara sau mai slaba pentru gestionarea rezistentei la rodenticide. In cazul utilizarii de rodenticide prin rotatie, se recomanda utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, daca exista, sau a unui anticoagulant mai puternic.

Nu utilizati in zone in care exista suspiciuni de rezistenta la substanta activa.

[Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului, si se aplica langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicatie.

Eliminati resturile de produs la sfarsitul perioadei de aplicare.

Nu folositi produsul ca momeala permanenta.

Daca folositi produsul in doza de soc: - Inlocuiti momeala consumata doar dupa 3 zile de la aplicare si apoi la intervale de maximum 7 zile. Adunati toata momeala varsata si cadavrele de rozatoare.

[Daca exista] Urmati instructiunile specifice impuse de codul de bune practici national aplicabil.

Utilizatori profesioniști instruiti: - exterior in jurul cladirilor

Soareci de casa si/sau sobolani

Maxim 20 g (soareci) sau 60 g (sobolani) de momeala in capcane nedemontabile sau capcane acoperite amplasate din 10 in 10 m (5 m in zonele cu infestare mare) sau direct in vizuina.

Verificati cata momeala s-a consumat si înlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel. *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Capcanele trebuie verificate doar la 5 - 7 zile la inceputul perioadei si cel putin saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala a fost consumata, daca capcanele sunt intacte si pentru inlaturarea cadavrelor rozatoarelor. Realimentati capcanele cu momeala, daca este necesar.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii.

Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

Nu utilizati prin rotatie anticoagulante diferite de putere similara sau mai slaba pentru gestionarea rezistentei la rodenticide. In cazul utilizarii de rodenticide prin rotatie, se recomanda utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, daca exista, sau a unui anticoagulant mai puternic.

Nu utilizati in zone in care exista suspiciuni de rezistenta la substanta activa.

[Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului, si se aplica langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicatie.

Protejati momeala impotriva intemperiiilor (ploaie, ninsoare, etc.). Amplasati capcanele in zone neinundabile.

Eliminati resturile de produs la sfarsitul perioadei de aplicare.

Inlocuiti toata momeala afectata de apa sau murdarie din capcane.

La utilizarea in vizuini: Amplasati momelile in asa fel incat sa minimizati expunerea speciilor nevizate si a copiilor. Acoperiti sau blocati intrarile vizuinilor momite pentru a reduce riscul de respingere sau varsare a momelii.

Daca folositi produsul in doza de soc: - Inlocuiti momeala consumata doar dupa 3 zile de la aplicare si apoi la intervale de maximum 7 zile. Adunati toata momeala varsata si cadavrele de rozatoare.

[Daca exista] Urmati instructiunile specifice impuse de codul de bune practici national aplicabil.

Utilizatori profesioniști instruiti: - canalizare

Sobolani

Infestare mare: 60 g momeala / gura de canalizare

Infestare mica: maxim 60 g momeala / gura de canalizare,

in capcane nedemontabile sau capcane acoperite amplasate din 10 in 10 m (5 m in zonele cu infestare mare).

Verificati cata momeala s-a consumat si inlocuiti momeala consumata sau stricata pana cand nu se mai consuma deloc. Repetati tratamentul cand apar dovezi de reinfestare (de ex. urme sau fecale noi). Verificati frecvent capcanele in primele 10-14 zile.

Urmati toate instructiunile suplimentare din codul relevant de bune practici.

Efectuati o analiza pre-momire a zonei infestate si o evaluare pe teren pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile unde sunt active si pentru a determina cauza probabila si dimensiunea infestarii.

Produsul se utilizeaza exclusiv in cadrul unui sistem integrat de control al daunatorilor (SICD) care include, printre altele, masuri de igiena ai, daca este posibil, metode fizice de control.

Nu utilizati prin rotatie anticoagulante diferite de putere similara sau mai slaba pentru gestionarea rezistentei la rodenticide. In cazul utilizarii de rodenticide prin rotatie, se recomanda utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, daca exista, sau a unui anticoagulant mai puternic.

Nu utilizati in zone in care exista suspiciuni de rezistenta la substanta activa.

[Daca se impune prin politici sau legislatie nationale] In cazul in care produsul se utilizeaza in zone deschise publicului larg, zonele tratate sunt marcate pe perioada aplicarii produsului, si se aplica



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

langa momeli, o nota explicativa privind riscul de intoxicatie primara sau secundara si primele masuri de luat in caz de intoxicatie.

Aplicati momelile in asa fel incat sa evitati contactul cu apa si eliminarea lor prin diluare.

Daca folositi produsul in doza de soc: - Inlocuiti momeala consumata doar dupa 3 zile de la aplicare si apoi la intervale de maximum 7 zile.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE : Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați momeala în ambalajul original, închis etans și ferit de lumină directă a soarelui.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE:
2 ani

ALTE INFORMATII, dupa caz:

Avand in vedere efectele adverse potientiale pentru sanatatea umana, se recomanda citirea cu maxima atentie a instructiunilor de pe eticheta si respectarea lor.

Respectarea restrictiilor pentru utilizarea produsului biocid si anume:

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeala în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca





MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

ANEXA
CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
Nr. RO/2019/0233/MRA/IE/BPA 70515

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **4.03.2019 și 29.07.2020 și 16.12.2022** a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

Data emiterii anexei autorizatiei: 20.12.2022

Data expirării autorizatiei: 01.07.2024

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologic

II. Prezenta anexă este parte integrantă din Certificatul nr. **Nr. RO/2019/0233/MRA/IE/BPA 70515**.

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

