

NEW!



MAXFORCE[®] Ant Bait
LN

**"O furnica duce-n spate
Un graunte jumatate..."**



**PROTECTING
TOMORROW
...TODAY**



Bayer Environmental Science
A Business Operation of Bayer CropScience

MAXFORCE® Ant Bait LN



• **MaxForce® LN** (Imidaclopride 0.5% w/w) este o momeala insecticida conditionata sub forma unei pulberi granulate de culoare alba, avand drept substanta activa **imidacloprid**, un neonicotinoid de generatia a II-a ce actioneaza asupra receptorilor acetilcolinici din membrana post-sinaptica, blocand functionarea centrilor nervosi ai daunatorului.

• **MaxForce® LN** este formulat ca o alternativa la insecticidele clasice, lichide, de contact, pentru combaterea principalelor specii de furnici, cu precadere a **furnicii negre de gradina** (*Lassius niger*);

• **MaxForce® LN** se utilizeaza pe terase, alei, zone pavate si alte cai de acces din jurul locuintelor, in garaje, subsoluri si in zonele in care sunt identificate infestari cu aceste insecte;

• Granulele de **MaxForce® LN** au la baza zaharul, iar furnicile se vor hrani din ele si in acelasi timp, le vor cara in musuroi, pentru hrana intregii populatii a coloniei. Astfel, furnicile vor muri in musuroaiele lor, de aceea este foarte probabil a nu se gasi furnici moarte, vizibile cu ochiul liber.

• Eradicarea completa coloniei poate lua 2-3 saptamani, in functie de conditiile specifice ale fiecarei locatii. Ceea ce se va observa, cu siguranta, in cateva zile de la tratament este o scadere (pana la disparitia totala) a activitatii coloniei.

• **MaxForce® LN** se va imprastia cu precadere in afara (outdoor), de-a lungul traseelor de circulatie ale furnicilor (in general, extrem de clar stabilite), si in zonele in care se observa cu ochiul liber intrari in musuroaie - terase, alei, zone pavate si alte cai de acces din jurul locuintelor, in zona garajului si a dependintelor casnice.

• Pentru o eficacitate maxima, **MaxForce® LN** va trebui plasat in crapaturi si/sau in zonele in care activitatea furnicilor este evidenta. Utilizati cca. 8g pentru fiecare musuroi. Daca puteti identifica mai multe intrari, utilizati doze egale pentru fiecare.

• Plasati granulele **MaxForce® LN**, preferabil, in zone protejate de ploaie. Daca totusi zona care impune tratamentul nu poate fi ferita de ploaie, efectuati tratamentul cu minim 24 de ore inainte de prognozarea unei potentiiale ploi. Daca, totusi, ploua in mai putin de 24 de ore de la efectuarea tratamentului sau zona tratata este puternic umezita (roua, etc), refaceti tratamentul. Daca musuroaiele sunt usor vizibile, plasati granulele de produs exact in zonele lor de intrare.

• A nu se utilizeaza direct pe sol, pe gazon sau pe straturile de vegetatie. Plasati granulele in locuri greu accesibile pentru copii, animale de casa si pasari.



Utilizarea in aer liber



Utilizarea in locuinte



Spatii comerciale
si industriale



Utilizarea in
zone publice



Profil tehnic:

Compozitie:	100 g de MaxForce® LN contin: Imidaclopride 0.5 gr. (0.5 %) – 5 gr./kg Coformulanti pana la 100 g
Formulare:	GR (granule de momeala insecticida)
Clasificare toxicologica:	Nu are
Clasificare de mediu:	N - periculos pentru mediu
Categorie de utilizatori:	Profesionali, Populatie
Aviz:	Nr. 2296BIO/18/05.14
Ambalaj:	Cutii de 1kg, 2.5 kg si 40 kg

Dozaj:

MaxForce® LN
8 - 10 g

Suprafata tratata
Punct de infestare
"musuroi"

Bayer Environmental Science
Tel: 021.529.5968 | Fax: 021.529.5990
Mobil: 0724 214 365
E-mail: bogdan.pitigoi@bayer.com
www.bayercropscience.ro

DISCLAIMER
Acest leaflet reprezinta un document publicitar si nu atrage nici un fel de responsabilitate juridica pentru grupul Bayer AG sau entitatile sale afiliate. Pentru utilizarea corecta a produselor cititi cu mare atentie si respectati intocmai indicatiile de pe eticheta produselor.