

Polyram® DF



Date tehnice

Substanță activă: 70% metiram
Formulare: Granule dispersabile în apă
Număr certificat omologare: 1369/21.12.1992
Ambalaj: 10 Kg



Caracteristici și mod de acțiune

Polyram® DF se prezintă sub formă de granule uniform dimensionate.

Polyram® DF este un fungicid cu acțiune multi-site pe bază de metiram, din grupa ditiocarbamaților.

Polyram® DF are acțiune de contact, împiedică germinarea sporilor ciupercilor, având însă efect și asupra dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. Are spectru larg de combatere a bolilor. Acțiunea sa inițială este foarte rapidă. Este selectiv față de plantele la care se aplică.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Cartof	<i>Phytophthora infestans</i>	Mană	1,8 kg/ha
	<i>Alternaria solani</i>	Alternarioză	1,8 kg/ha
Ceapă	<i>Peronospora destructor</i>	Mană	0,2%
Castraveți	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mană	0,2%
Tomate	<i>Phytophthora infestans</i>	Mană	0,2%
	<i>Septoria lycopersici</i>	Pătarea albă	0,2%
	<i>Cladosporium fulvum</i>	Pătarea cafenie	0,2%
	<i>Alternaria solani</i>	Alternarioză	0,2%
Tutun	<i>Peronospora tabacina</i>	Mană	0,2%
Păr, măr	<i>Venturia spp.</i>	Rapăn	0,25%
Viță de vie	<i>Plasmopara viticola</i>	Mană	0,2%
Flori (garioafe)	<i>Uromyces caryophyllinus</i>	Rugină	0,3%



Recomandări

Polyram® DF fiind un fungicid de contact, tratamentele trebuie făcute preventiv. În funcție de evoluția condițiilor climatice și de evoluția bolii, tratamentele se repetă la un interval de maxim 10-14 zile, iar

dacă este cazul la intervale mai scurte. Polyram® DF se recomandă a se utiliza la începutul perioadei de vegetație. De asemenea, la vița de vie, se recomandă în tratamentele de contact acuprice de la începutul perioadei de vegetație.

Atenție!

Referitor la clasificarea produsului:

Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr. 1272/2008. Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.



Tehnica de aplicare

Timpe de pauză: măr, păr - 21 zile; tomate - 7-14 zile; cartof - 14 zile; viță de vie - 56 zile; ceapă - 7 zile, castraveți - 3 zile. Volumul de apă: cartof și castraveți 600-800 l/ha, tomate 800- 1000 l/ha, măr 500-1500 l/ha, păr 500-1000 l/ha, viță de vie și flori 1000 l/ha.



Avantaje

- Produs cu acțiune rapidă și efect multi-site.
- Formulare de înaltă calitate a produsului care determină o mai mare eficacitate în combaterea bolilor.
- Bună aderență la suprafața frunzelor.
- Risc foarte scăzut de apariție a rezistenței.



Cultura

