

TIMPANI

FUNGICID

pentru combaterea bolilor la cerealele păioase

Conține: 250 g/l clorotalonil +90 g/l tebuconazol
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 158PC/16.03.2016



PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Timpani este o suspensie concentrată ce se prezintă sub forma unui lichid, ce conține 250 g/l clorotalonil și 90 g/l tebuconazol.

AVANTAJE

- O combinație originală ce oferă o doză eficientă de clorotalonil;
- **Timpani** conține două s.a complementare pentru un management mai bun în combaterea rezistenței;
- Combate foarte bine Septorioza;
- Formulare de calitate ridicată, gata pentru utilizare, ușor de amestecat cu alte produse de uz fitosanitar;
- Spectru larg și eficacitate ridicată împotriva bolilor importante, atât foliare cât și ale spicului.

MOD DE ACȚIUNE

Timpani combină eficiența recunoscută a tebuconazolului asupra unui spectru larg de boli, cu activitatea clorotalonilului de combatere a apariției formelor rezistente.

Clorotalonilul este un fungicid de contact, cu acțiune multiplă asupra unui spectru larg de ciuperci fitopatogene. Acțiunea lui preventivă împiedică instalarea infecțiilor la suprafața organelor tratate, inhibând germinarea sporilor. Este cel mai eficient partener pentru triazoli în controlul lui *Septoria sp.*

Tebuconazolul, face parte din grupa triazolilor și este un fungicid sistemic cu acțiune preventivă și curativă. Asigură protecție de lungă durată.

Asocierea celor două substanțe active (clorotalonil și tebuconazol), îmbunătățește semnificativ controlul asupra Septoriei și micșorează riscul de infecție pentru anul următor.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

Timpani este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA
Grâu	Septorioza	2 l/ha
Orz	Făinare, Arsura frunzelor	2 l/ha

TIMPANI

FUNGICID



RECOMANDĂRI DE APLICARE continuare

La GRÂU: Tratamentul se va aplica preventiv sau imediat ce apar primele simptome ale bolii iar cultura este în faza de dezvoltare de la primul internod și până la începutul înfloritului (BBCH 31-BBCH 61). Se pot aplica maxim 2 tratamente pe un ha de cultură într-un sezon de vegetație.

Tratamente se vor aplica la interval de 14-28 de zile în funcție de condițiile de vreme și de presiunea bolilor. Cantitate de soluție (produs + apă) recomandată a se utiliza pe un ha este cuprinsă între 200 - 400 L.

La ORZ: Se vor aplica 1-2 tratamente în perioada când plantele de cultură sunt în faza de dezvoltare de la primul internod până la sfârșitul formării înflorescenței (BBCH 31-59), la interval de 12-21 zile între tratamente, depinzând de condițiile de vreme și presiunea bolilor.

Cantitatea de soluție recomandată a se utiliza pe un ha de cultură va fi cuprinsă între 200 - 400 L. Doza maxima de produs care se va aplica pe un tratament este de 2 L/ha /tratament.

Pentru eficacitate maximă, produsul se va aplica preventiv.

Restricții:


Nu se aplică înainte de începutul alungirii paiului atât la grâu cât și la orz (BBCH 30)!
Nu se va iriga 24 de ore după aplicarea tratamentului!

Se pot aplica max. 2 tratamente cu **Timpani** pe aceeași cultură!

TIMPANI


FUNGICID

COMPLEMENTARITATE PENTRU COMBATAREA BOLILOR LA GRÂU



SPECTRUL LARG CU COMBATERE FOARTE BUNĂ A SEPTORIOZEI

COMPLEMENTARITATE PENTRU COMBATAREA LUI SEPTORIA TRITICI



Spectru larg de combatere și o soluție robustă în combaterea lui Septoria tritici.

O importantă unealtă în managementul combaterii rezistenței!

TIMPANI

FUNGICID



COMPATIBILITATE

Este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare, dar pentru o folosire corectă, consultați lista de compatibilități înainte de utilizare și efectuați un test.

DISTRIBUITOR

Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureșanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, București
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320

DEȚINĂTOR OMOLOGARE

Nufarm UK LTD, Wyke Lane, Wyke, 13, Bradford, West
Yorkshire, BD129EJ