

Interior și exterior, în jurul clădirilor (clădiri urbane și agricole)

Şobolanii:

Securizări momeală în cantități de 15 - 60 gr în stații de intoxicare acoperite, protejate cu cheie care se placează la interval de 10 m (5m în zonele cu infestație ridicată) în zonele în care șobolanii au fost semnalati. Verificați la intervale regulate consumul momelilor și înlocuiți-le pe cele consumate, sau deteriorate, până când consumul încrețează. Repetați tratamentul în cazul infestațiilor nou apărute (ex. urme noi de excremente).

Nu mutați și nu deranjați statile de intoxicație timp de câteva zile după plasarea momelii. Dacă în 7 – 10 zile nu se semnalizează consumul momelii din statile de intoxicație mutați-le în alta zonă pe care o considerați infestată cu șobolani. Dacă totușă momela a fost consumată, refîncărcați statile de intoxicație cu cantitatea de momeală maximă admisă și plasați mai multe stații de intoxicație. Înlocuiți momelile consumate de rozătoare, sau cele care au fost afectate de apă sau contaminate de murdărie. Nu măriți cantitatea de raticid în statia de intoxicație.

În sistemele de canalizare – Pentru utilizare în sistemele de canalizare, unde nu există risc pentru copii, animale de companie și specii neavizate se vor securiza plicurile la structurile disponibile, cu sărmă, astfel încât plicurile să nu fie luate de apă. Securizați momeli de 15 – 60 gr pe stație la structurile disponibile astfel încât momeala să nu fie luate de apă. Verificați la intervale regulate consumul momelilor și înlocuiți momelile consumate sau deteriorate până când consumul încrețează. Repetați tratamentul în cazul infestațiilor nou apărute.

Şoareci:

Securizări momeli de 15 gr în stații de intoxicație acoperite plasate la interval de 5m (2m în zonele cu infestație ridicată) în zonele în care au fost văzuti șoareci. Verificați la intervale regulate consumul momelilor și înlocuiți-le pe cele sau deteriorate până când consumul încrețează. Repetați tratamentul în cazul infestațiilor nou apărute (ex. urme noi de excremente).

Şoareci sunt foarte curioși, și ar putea ajuta programul de combatere dacă atât momelele la interval de 2-3 zile, atunci când punctele de intoxicație sunt inspecțiate și reumplute. Controlați frecvența punctelor de intoxicație în primele 10-14 zile și înlocuiți momelile consumante de rozătoare, sau cele care au fost afectate de apă sau care au fost contaminate de murdărie. Dacă totușă momela din a fost consumată, refîncărcați statile de intoxicație cu cantitatea de momeală maximă admisă și plasați mai multe stații de intoxicație. Nu măriți cantitatea de raticid în statia de intoxicație.

Informații privind rezistență

Trebue să se țină cont de rezistența populației de rozătoare la brodifacoum atunci când se decide tipul de rodenticide care urmărează a fi folosit. În cazul în care se constată, sau se suspectează, rezistență la Brodifacoum, se va recurge la strategii de management al rezistenței.

Instrucțiuni de depozitare

A se păstra la rece, într-un loc uscat și bine ventilat. Păstrați numai în recipientul original
A se păstra sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale.

Instrucțiuni pentru eliminarea, în deplină siguranță

A nu se elimină acest produs și ambalajul său decât după ce s-a luat toate precauțiile.

Ambalajul, produsul neutilizat și rozătoarele moarte se vor elmina conform reglementărilor locale.
Dacă este cazul, consultați autoritatele locale.

S1+S2 - A se păstra sub cheie; A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S13 - A se păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale

S20+21 - A nu se consumă alimente și băuturi pe durata utilizării; fumatul interzis pe durata utilizării

S24 - A se evita contactul cu pielea

S35 - A se elimină reziduurile produsului și ambalajului (recipientul) după ce s-a luat toate măsurile de precauție (pentru utilizarea profesională)

S37 - A se păstra numai de protecție corespunzătoare (pentru utilizarea profesională)

S46 - În caz de înghitire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta

S49 - A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original S61 - A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișă cu date de securitate.

P13 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P103 - Citiți eticheta înainte de utilizare

P220 - A se păstra/depozita departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale

P226 - Evitați contactul cu pielea

P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

P273 - Evitați dispersarea în mediul

P280 - Purtați mănuși de protecție (pentru utilizarea profesională)

VERTOX PASTA BAIT

Contine Brodifacoum 0,005% w/w
și benzoate de denatoniu 0,001% w/w

Momeală sub formă de pastă, gata de utilizare, care conține brodifacoum (0,005%) pentru folosire ca rodenticid de către utilizatorii profesioniști pentru combaterea șobolanilor și șoareciilor în interior și exterior, în jurul clădirilor, pentru protecția sănătății publice, a produselor și a materialelor depozitate.

Se folosește exclusiv ca rodenticid. Exclusiv pentru uz profesional. A NU se vinde utilizatorilor amatori. Se recomandă utilizarea durabilă și în siguranță a produselor biocide. Este ilegală utilizarea acestui produs în alte scopuri, sau în alte modalități, decât cele descrise pe etichetă.

Autorizație Nr. RO/2014/0064/MRA/IE/BPA-70239/IE/BPA-70238

Ambalajul este de

5kg



Dezinător autorizației:



Distribuit de:



PelGar International Ltd.,
Altan, GU34 2QR, UK
Tel: +44 1429 89744

RODEX este o marca înregistrată
a PelGar International Ltd.

Instrucțiuni de utilizare și de manipulare în siguranță

> Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare și urmăriți instrucțiunile.

> Produsul trebuie manipulat în siguranță.

> În cazul utilizatorilor profesioniști se recomandă folosirea echipamentului individual de protecție (EIP).

> A se păstra mânuși de protecție corespunzătoare.

> Nu decantăți produsul în recipient nechetăcat.

> Evitați toate expunerile inutile, în special ingerarea. Evitați contactul cu pielea.

> O inspecție minujoasă a zonelor infestate este esențială, în special în locuri izolate și adăpostite, pentru a determina gradul de infestație.

> Momelele se vor depozita într-un loc securizat, în stații toxice sau alte aplicații în său fel încât să reducă riscul consumului acestora de către alte animale sau de către copii. Acolo unde este posibil, momelele se vor fixa pentru a nu putea fi trase și îndepărătate.

> Rozătoarele moarte, resturile de momeală nefolosite sau fragmentele de momeale găsite la distanță de stația de intoxicație vor fi adunate în timpul operațiunilor de control pentru a minimiza riscul de consum și otrăvire a copiilor, animalelor de companie și a altor animale nevezite.

> Nu mâncați, nu beți și nu fumați pe durata utilizării.

> Spălați mâinile și făta după aplicarea și utilizarea produsului, și înainte să mâncați, să beți sau să fumați.

Utilizarea în spații publice

Dacă produsul este utilizat în spații publice și nu se folosesc stații de intoxicație, se vor implementa următoarele măsuri. Se marchează zona tratată pe toată durata. Imprenuta cu momelele, se furnizează o notificare în care să se explice riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulanți, precum și măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire. Dacă se folosesc stații de intoxicație securizate cu cheie, acestea trebuie marcate clar pentru a indica că au în interior sunt rodenticide și că nu trebuie deranjate.

Perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate: Nu se aplică
Intervalul de timp care trebuie respectat între utilizările produsului biocicid: Nu se aplică.
Intervalul de timp pentru acces al oamenilor în zonele în care s-a folosit produsul biocicid: Nu se aplică.
Efectul biocicid (activitate biocicida) apare după 3/6 ingerări repetate ale momelii, având drept timp de acțiune o perioadă cuprinsă de 3 și 15 zile. Nu curățați stațiile de intoxicație în timpul reîmpărtășirii momelii.

Stațile de intoxicație trebuie să conțină numai rodenticide. A nu se deschide pliculete de momeală. Îndepărtați stațiile de intoxicație, când tratamentul este finalizat. Primul ajutor

In caz de accident, ingerare accidentală sau dacă via simții rău, cereți imediat sfatul medicalului (dacă este posibil, arătați eticheta). În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. Dezbrăcați și spălați imbrăcăminte contaminată. În caz de contact cu ochii, scoateți lentilele de contact, dacă purtați, și clătiți cu grijă

cu apă timp de 15-20 minute. Cereți imediat sfatul medicalului. În caz de înghitire, cereți imediat sfatul medical și arătați recipientul sau eticheta.

Informații pentru medic

Antidot- Vitamină K1 – se administrează sub supraveghere medicală.

Reacții apar când coagулarea săngelui este inhibată, prin interacție cu vitamina K1. Simptomele de intoxicație pot include: învințirea cu mai multă uscăță, hemoragiile sau gingivale, sânge în scaun sau urină, sângerări excesivă la nivelul tăieturilor sau abraziunilor minore. Atenție, simptomele de intoxicație se pot dezvolta pe parcursul a câteva zile.

In caz de intoxicații accidentale

Informații despre otrăviri: Pentru informații sau pentru a raporta un incident de intoxicație contactați Telefon 021 318 3620 reținetă eticheta ca referință. www.ANPM.ro Telefon de urgență: 021-3183606 | 021-318 36 20 (interior 235)

E-mail: vanzari@pc-e.ro

Biroul pentru Regulamentul Sanitar International și Informare (orele 8:00 - 15:00)

Institutul Național de Sanitate Publică str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 1 - 3, sector 5, 050463, Bucuresti

Informații suplimentare de siguranță

A se evita dispersarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișă tehnică de securitate.

Respectați instrucțiunile de utilizare pentru a evita riscurile pentru om și mediul. Folosiți recipiente pentru momeli marcate clar "Otrava" la toate punctele de intoxicație. Pe perioada de tratament, și după încheierea tratamentului, se vor îndepărta orice resturi de momeli, rozătoare moarte și se vor elimina în mod responsabil. Preveniți accesul la momeala și la copililor, animalelor domestice și de companie (în special pisici, căini sau porci). Este ilegală utilizarea acestui produs cu scop intoxicații intenționate a animalelor nevezite, benefice și protejate. Nociv pentru flora și fauna sălbatică.

Număr de serie: 61640200
Data expirării: 02/2016



5 060049 812779 >