


MYSTIC 250 EC

FUNGICID

Conține: 250 g/l tebuconazol
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 2735/19.12.2007



PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Mystic 250 EC este un fungicid sistemic din grupa triazolilor, prezentat sub forma unui concentrat emulsionabil de culoare galben deschis.

MOD DE UTILIZARE

În general, aplicarea tratamentelor se face la avertizare. La cerealele păioase, **Mystic 250 EC** se aplică primăvara, după înfrățire. La măr, tratamentele se aplică preventiv sau curativ, la avertizare, după scuturarea petalelor. La cultura de rapiță, se poate aplica un tratament în toamnă, în faza de rozetă a plantelor de rapiță, pentru protejarea culturii împotriva atacului de *Phoma lingam*. Aplicat în toamnă, **Mystic 250 EC** are și acțiune de regulator de creștere, determinând scurtarea tijeii, respectiv creșterea rezistenței plantelor la iernare. Primăvara sau vara se aplică împotriva bolilor foliare, în doză de 1 l/ha.

MOD DE ACȚIUNE

După aplicare, substanța activă este rapid preluată și distribuită în plantă, acționând prin inhibarea biosintezei ergosterolului în pereții celulari ai agenților patogeni țintă. Efectul este îndelungat dar se poate aplica și preventiv pentru un mai bun control al bolilor. Produsul se translocă acropetal, protejând creșterile noi.

AVANTAJE

- are efect preventiv și curativ;
- spectru larg de acțiune;
- eficacitate de lungă durată;
- se translocă acropetal acționând sistemic asupra agenților patogeni.





● RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Produsul este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENTUL PATOGEN	DOZA Kg/Ha
Grâu	Fuzarioza (<i>Fusarium spp.</i>)	0,75 l/ha
	Boli foliare și ale spicului (<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Helminthosporium spp.</i> , <i>Puccinia spp.</i>)	0,5 l/ha
Măr	Răpănul mărului (<i>Venturia inaequalis</i>), făinarea mărului (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă)
Orz	Boli foliare și ale spicului (<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Pyrenophora teres</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> , <i>Helminthosporium sativum</i>)	0,5 l/ha
Rapiță	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Phoma lingam</i> , <i>Erysiphe communis</i>	1 l/ha (tratament aplicat primăvara - vara)
	Tratament aplicat toamna pentru creșterea rezistenței plantelor la iernare și pentru prevenirea atacului de <i>Phoma lingam</i>	0,5 l/ha
Viță de vie	Făinarea (<i>Uncinula necator</i>)	0,4 l/ha în 1000 l apă

● COMPATIBILITATE

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultați lista de compatibilități și efectuați un test.

PRODUCĂTOR

Nufarm GmbH & Co KG
25 Peter Strasse, 4021 Linz,
Austria

DISTRIBUITOR

Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureșanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, București
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320